

Oxiser® 50 WP

Formulation : WP.

Composition : 50 % de l'Oxychlorure de cuivre.

Famille chimique : minérale.

Mode d'action :

Oxiser® 50 WP est un fongicide à base d'oxychlorure de cuivre. Il agit par contact avec une action multisites sur les maladies causées par des champignons pathogènes qui affectent la végétation et les fruits de diverses cultures.

Oxiser® 50 WP possède plusieurs propriétés :

- Il est à la fois bactéricide et fongicide :
- Il bloque la germination des spores des champignons.
- Il permet d'agir de façon préventive contre les bactéries.

Usages et doses :

Culture	Maladies	Dose	D.A.R
Pêcher	Cloque	300 g/hl	15 Jours

Oxiser® 50 WP contrôle un large éventail de maladies fongiques : alternaria, anthracnose, bactériose, black-rot, botrytis, mildiou, moniliose, phomopsis...

Mode d'utilisation :

Oxiser® 50 WP est recommandé pour les traitements d'hiver, après la chute des feuilles.

l'**Oxiser® 50 WP** est à utiliser avec précaution en été, car il peut brûler le feuillage, et en automne, car il peut nécroser de jeunes pousses. Il ne doit pas être pulvérisé au stade floraison.

Oxiser® 50 WP a une libération moyenne. Agissez par temps sec. En cas de pluie sur le traitement réalisé, il sera utile de le répéter.

Oxiser® 50 WP peut être mélangé avec les huiles minérales pour réaliser, en hiver, à la fois le traitement fongique et insecticide.



أوكسيزار® WP 50

الصبغة: مسحوق قابل الإستعمال بعد مزجه في الماء (WP).
التركيب: 50% من أكسيكلوريد النحاس.
العائلة الكيميائية: معادن.

طريقة التأثير

أوكسيزار® WP 50 مبيد فطري يتكون أساسا من أكسيكلوريد النحاس. يعمل باللامسة و يؤثر على مواقع متعددة للأمراض الناتجة عن الفطريات التي تؤثر على النبات و ثمار مختلف المحاصيل الزراعية.

أوكسيزار® WP 50 له مميزات مختلفة:

- مبيد للبكتيريا و الفطريات في نفس الوقت.
- يوقف انتشار أبواغ الفطريات.
- يسمح بالتأثير بطريقة وقائية ضد البكتيريا.

الإستعمالات و الجرع:

المحصول الزراعي	المرض	الجرعة	مدة ما قبل الجني
أشجار الخوخ	مرض تجعد أوراق الخوخ	300 غ/هكل	15 يوما

أوكسيزار® WP 50 يتحكم في عدد كبير من الأمراض الفطرية: الألترناريا، الأنتراكنوز، البكتيريوز، التعفن الأسود، البوتريتيس، الميلديو، المونيليز، الفوموبسيس... إلخ.

طريقة الإستعمال

أوكسيزار® WP 50 يُنصح استعماله للمعالجة الشتوية، بعد سقوط الأوراق.

أوكسيزار® WP 50 يُستعمل بحذر في فصل الصيف لأنه يمكن أن يحرق الأوراق و في فصل الخريف لأنه يمكن أن يسبب موت البراعم. لا يجب رشه في مرحلة الإزهار.

أوكسيزار® WP 50 يتحرر ببطء، يرجى القيام بالمعالجة في جو جاف و في حالة سقوط المطر ينبغي إعادة المعالجة.

أوكسيزار® WP 50 يمكن مزجه بزيوت معدنية لإجراء المعالجة الشتوية ضد الفطريات و الحشرات في نفس الوقت .

