



# POMME DE TERRE

## REGIONS SUD

Programme de fertilisation, de nutrition et des traitements phytosanitaires



Objectif de rendement: 50 T/ha

		Plantation	Levée (Buttage)	Croissance active	Tubérisation	Grossissement des tubercules	Sénescence -Récolte	
<b>Fertilisation</b>	NPK	Patroot® 5 qx/ha	Patgreen® 5 qx/ha		Patgreen® 6 qx/ha	Patfert® 5 qx/ha		
<b>Nutrition</b>	Acide humique	Humistar® 25 L/ha avant chaque apport d'engrais			Humistar® 25 L/ha avant chaque apport d'engrais			
	Acides aminés	Delfan® Plus 2 L/ha ou Microfert® 2 L/ha A chaque période de stress ou de traitement						
	Stimulation des défenses naturelles					Trafos® K 2 applications de 3 L/ha		
	Prévention et correction des carences					Tradecorp® AZII 3 applications de 1 kg/ha		
	Potassium foliaire						Fainal® K 2 applications de 3 L/ha	
<b>Adventices</b>	Adventices	Sencor® 0,75 l/ha ou Prowl® Aqua à 3 L/ha						
<b>Maladies</b>	Bactéries		Aliette® Flash 2,5 kg/ha	Naturam® 5 2,5 L/ha		Aliette® Flash 2,5 kg/ha		
	Mildiou		Bravo® 2 à 3 applications de 2 L/ha		Consento® 2 applications de 1.5 L/ha	Carial® 4 kg/ha	Revus® 0,5 L/ha	
	Alternaria					Score® 0,5 L/ha - 2 applications		
<b>Insectes</b>	Insectes du sol	Force® 12 kg/ha						
	Noctuelles							
	Pucerons		Actara® 0,1 kg/ha		Bonanza® 1 L/ha	Engeo® 0,2 L/ha		
	Teigne						Voliam® Targo 0,45 L/ha	
	Acariens				Vertimec® 0,5 L/ha			

	Fongicide		Herbicide		Application racinaire
	Insecticide		Fertilisation et nutrition		Application foliaire

Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez **Lower® 7** à la dose de 300 ml/ 1000L d'eau.

Pour corriger la salinité du sol, utilisez **Saltrad®** 20 L/ha, fractionner en 3 applications.





المردود المستهدف : 50 طن/هك

الشيخوخة - الجني	تضخم الدرنات	تشكل الدرنات	النمو السريع	الإنبات (جمع التربة حول الساق)	الفرس	التسميد
						الأزوت، الفوسفور، البوتاسيوم (NPK)
	باتفارت® 5 ق/هك	باتفرين® 6 ق/هك		باتفرين® 5 ق/هك	باتروت® 5 ق/هك	حمض الهيوميك
	هيوميستار® 25 ل/هك قبل إضافة الأسمدة			هيوميستار® 25 ل/هك قبل إضافة الأسمدة		الأحماض الأمينية
	دلفان® بلس 2 ل/هك أو ميكروفارت® 2 ل/هك في كل فترة إجهاد أو معالجة					تحفيز المقاومة الطبيعية للنبته
		طرافس® K استعمال مرتين بجرعة 3 ل/هك				الوقاية و التخلص من أعراض النقص
		ترادكوب® AZ II 3 استعمالات بجرعة 1 كلغ/هك				البوتاسيوم على الأوراق
	فينال® K استعمال مرتين بجرعة 3 ل/هك					
					سكور® 0.75 ل/هك أو براول® أكوا 3 ل/هك	الأعشاب الضارة
		أليات® فلاش 2.5 كلغ/هك		أليات® فلاش 2.5 كلغ/هك	أليات® فلاش 2.5 كلغ/هك	البكتيريا
	ريفوس® 0.5 ل/هك	كاربال® 4 كلغ/هك		برافو® 2 إلى 3 استعمالات بجرعة 2 ل/هك		الميلديو
	سكور 0.5 ل/هك - استعمال مرتين		كونستو® استعمال مرتين بجرعة 1.5 ل/هك			الألترناريا
					فورس® 12 كلغ/هك	حشرات التربة
			بونزا® 1 ل/هك			الفراشات الليلية
		إنجيو® 0.2 ل/هك		أكتارا® 0.1 كلغ/هك		حشرات المن
	فوليام® تارفو 0.45 ل/هك					السوس الفراشي
		فرتيمك® 0.5 ل/هك				القراديات (الرتيلة)



لتحميض محلول الأسمدة و محلول المعالجة بالمبيدات الفلاحية، استعمالوا لور® 7 بجرعة 300 ملل / 1000 ل من الماء .  
للتخلص من ملوحة التربة، استعمالوا سالتراد® 20 ل/هك، مع تقسيم الجرعة إلى 3 استعمالات.

