



AGRUMES

Programme d'amendements organiques, de nutrition, fertilisation foliaire et de traitements phytosanitaires

Objectif 600 q/ha

Profert

	POST RECOLTE	FEUILLES VISIBLES	POUSSE EN CROISSANCE	BOUTON VERT	DÉBUT DE LA FLORaison	PLEINE FLORaison	NOUAISON	GROSSISSEMENT	MATURITE
Fertilisation	* Organo Citrus® 14 q/ha + Calnisol® 1 q/ha							* Tchinsol® 2 : 3 q/ha + Calnisol® 1 q/ha + Magnesol® 0,5 q/ha	* Tchinsol® 2 : 3 q/ha + Azomagsol® 0,75 q/ha
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES	Adventices	* Basta® 3 L/ha						* Gallant Super® 1,5 L/ha	
	Gommosé							* Alette® Flash 2,5 kg/ha	
	Botrytis					* Chorus® 0,7 kg/ha			
	Alternaria							* Stroby® 0,2 kg/ha	
	Anthracnose							* Score® 0,2 L/ha	
	Maladies de post récolte								* Chorus® 0,7 kg/ha
	Cochenilles	* Naturam® 5 2,5 L/ha + Afaio Elite® 0,5 à 2 L/ha Traitement d'hiver							
	Thrips					* Tracer® 40 ml/lh			
	Pucerons								
	Mouches blanches								
	Mineuse								
	Vers de l'ombilic								
	Acarien jaune								
	Cératite								Nutrel® 3 L/ha + Deltharin® 0,5 L/ha*
NUTRITION	Acide humique								
	Régulateur de croissance								
	Acides aminées	* Phylgreen® 1,5 L/ha							
	Fer								
	Zinc et Manganèse								
	Calcium								
	Bore								
	Phosphites de potassium								
	Potasse liquide								
	Anti stress								
* Fractionner la dose complète de l' Humistar® en 3 à 4 applications.									
• NB: Il est conseillé d'éviter les traitements au stade floraison.									
• Fainal K : Fractionner la dose de 3L/ha en 2 applications									
* Appliquer l'association Nutrel® + Deltharin® pour piégeage massif (50 à 80 pièges/ha).									
• Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez Lower® 7 à la dose de 300 ml/ 1000 L d'eau.									
• En cas de stress (traitement phytosanitaire, température élevée, sécheresse, gel...etc.) utilisez Delfan® Plus ou Microfert® ou Vegenergy® à raison de 3 L/ha.									
• Pour améliorer l'efficacité des fongicides, insecticides et herbicides rajouter Codacide® 1 à 2,5 L/ha .									

Application racinaire
 Application foliaire

- Fractionner la dose complète de l'**Humistar®** en 3 à 4 applications.
- NB: Il est conseillé d'éviter les traitements au stade floraison.
- Fainal K** : Fractionner la dose de 3L/ha en 2 applications

* Appliquer l'association **Nutrel® + Deltharin®** pour piégeage massif (50 à 80 pièges/ha).

- Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez **Lower® 7** à la dose de 300 ml/ 1000 L d'eau.
- En cas de stress (traitement phytosanitaire, température élevée, sécheresse, gel...etc.) utilisez **Delfan® Plus** ou **Microfert®** ou **Vegenergy®** à raison de 3 L/ha.
- Pour améliorer l'efficacité des fongicides, insecticides et herbicides rajouter **Codacide® 1 à 2,5 L/ha**.





النضج	التضخم	العقد	الإبزهار الكلي	بداية الإبزهار	برعم الأخضر	النمو النباتي	أوراق ظاهرة	بعد الجني	
									التسميد
تشينصول® 2 : 3 ق/هك + كالينصول® 1 ق/هك + مغنيصول® 0,5 ق/هك	+ أزوماً مقصول® 0,75 ق/هك					أورمانو سيتروس® 14 ق/هك + كالينصول® 1 ق/هك			الأعشاب الضارة
كالنت سوبر® 1,5 ل/هك							باسطا® 3 ل/هك		الفوموز
* أليات® فلاش 2.5 كلغ/هك (مرتين على الأقل)			كوريتس® 0.7 كلغ/هك						البوتريبيس
	سكور® 0.2 ل/هك		سطروبي® 0.2 كلغ/هك						أ لترناريا
كوريتس® 0.7 كلغ/هك									الأنتراكونز
دالثارين® 0,5 ل/هك	نوري® برو 100 مل/هك		موفنتو® 1.2 ل/هك	ترامبر® 40 مل/هك			وابيد® 30 غ/هك		أمراض مابعد الجنبي
									الحشرات القشرية
		أبهولد® 0.35 ل/هك	فرتيملك® 0.5 ل/هك						التربيس
		بامييت® 0,4 ل/هك أو مافوس® 0,75 ل/هك	مافوس® 0,75 ل/هك	فرتيملك® 0,5 ل/هك					المن
نوتزال® 3 ل/هك + دالثارين® 0,5 ل/هك *									الذباب الأبيض
									الحشرات الحافظة
									دودة ثمار الحمضيات
									الرتبة الصفراء
									ذبابة الفاكهة
					هيوميسنار® 50 ل/هك				الحمض الهيوميكي
	بريستو® 2,4 ل/هك			أوكوجيب® 0.6 ل/هك					معدل النمو
	أوكوجيب® 0.3 ل/هك				دلفان® بلوس أو ميكروفارت® 3 ل/هك أو فيجينيرجي® 2 ل/هك		فيليفرین® 1.5 ل/هك		الأحماض الأمينية
		دلفان® بلوس أو ميكروفارت® 3 ل/هك أو فيجينيرجي® 2 ل/هك							الحديد
		سيكسستان® أو أولترافيرو® 15 كلغ/هك			سيكسستان® أو أولترافيرو® 15 كلغ/هك				الزنك والمنغنيز
	بورامين® 3 ل/هك	بورامين® 3 ل/هك			ترادسيتروس® 1.5 كلغ/هك		فيليفرین إكترا® 1,5 ل/هك		الكلاسيوم
		ترليور® 1 ل/هك				فيليفرین أليا® 2 ل/هك			البور
		طرافس® 6 ل/هك					طرافس® 6 ل/هك		فوسفيت البوتاسيوم
	فينال® 3 ل/هك (مرتين)								بوتاسي سائل
هيليوپوليس® 1 إلى 2 ل/هك أو إكلبس® 12,75 إلى 21,25 كلغ/هك									مضاد للإجهاد



- لتحميف محلول الأسمدة و محلول المعالجة بالمبيدات الفلاحية، استعملوا لور® 7 بجرعة 300 مل/ 1000 ل من الماء.
- في حالة الإجهاد (المعالجة بالميديات الفلاحية، درجة حرارة عالية، جفاف، جليد...) استعملوا دلفان® بلوس أو ميكروفارت® أو فيجينيرجي® بجرعة 3 ل/هك.
- فينال® k تقسيم 3 ل/هك إلى جرعتين.

- تقسيم الجرعة الكاملة لهيوميسنار® من 3 إلى 4 استعمالات.
- ملاحظة هامة: يُنصح تفادي المعالجة في مرحلة الإبزهار.
- لتحسين فعالية ميديات الفطريات، الحشرات والأعشاب إضافة كوداسييد® 1 إلى 2.5 ل/هك منزج نوتزال® + دالثارين® لاصطياد الحشرات بعداد كبيرة (50) إلى 80 مصيدة/هك.

استعمال جذري
استعمال ورقي