




Maïs Fourrage ou Grain

Programme de fertilisation, nutrition
et traitements phytosanitaires.

REGIONS
SUD



Objectif de rendement : Maïs grain : 90 q/ha. Maïs fourrage : 40 t/ha avec un taux de matière sèche de 35%.

SEMIS	LEVÉE	3 FEUILLES	6 FEUILLES	8 À 10 FEUILLES	12 FEUILLES	PANICULE VISIBLE	FLORAISON FEMELLE	MATURITÉ
								
Weatfert® 3 à 3,5 q/ha ou Northweat® 3,5 à 4 q/ha ⚡								
		Azosul® 5 à 6 q/ha Azoplus® 5 q/ha ou Azofert® 9 q/ha ⚡						
	Startsol® 25 kg/ha ⚡	Magisol® 25 kg/ha ⚡				Fatsol® ou Finalsol® ou Kalinitisol ou Potasol® 25 kg/ha ⚡		
	Humistar® 60 L/ha ⚡							
			Tradecorp® AZ II 3 kg/ha ou Aton® AZ 3 L/ha ⚡					
			Ultraferro® ou Sequestrene® ou Tradeferro® K6 ou Greenfer® Energy 3 kg/ha ⚡					
		Tradecorp® Mn 5 kg/ha ⚡						
		Tradecorp® Zn 3 kg/ha ⚡						
	Ruter® AA Veg® 3 L/ha ⚡				Microfert® ou Delfan® Plus 3 L/ha ou Phylgreen® 1 L/ha ⚡			
					Final® K 10 L/ha ⚡			
				Trafos® K 3 L/ha ⚡				
Prowl® Aqua 2,5 L/ha ⚡	Casper® 0,3 kg/ha ⚡							
			Deltharin® 0,5 L/ha ou Uphold® 0,35 L/ha ou Biospi® 0.2 L/ha ou Proclaim 250 g/ha ⚡					

Concept Profert SPA 2024

 Application racinaire

 Application foliaire

- Pour acidifier la bouillie de traitement phytosanitaire, utilisez **Lower[®]** 7 à la dose de 300 ml/1000 L d'eau.
 - Utiliser les Bio-stimulants (**Delfan[®] Plus** ou **Microfert[®]**) en période de stress abiotique (gel et sécheresse) et stress biotique (attaque de maladies et ravageurs)
- NB :** Les espèces de lépidoptères: **Ouargla:** la noctuelle du maïs, la noctuelle de la tomate. **Adrar, El Menia et Timimoun :** la noctuelle de la tomate.



الذرة أعلاف أو حبوب

المردود المستهدف : الذرة حبوب : 90 ق/هك. الذرة علف : 40 ط/هك بنسبة مادة جافة تبلغ 35%.



البذر	الإنبات	3 أوراق	6 أوراق	8 إلى 10 أوراق	12 ورقة	بروز العنقود الزهري	إزهار أنثوي	النضج
								
ويتفارت® 3 إلى 3,5 ق/هك أو نورثويت® 3,5 إلى 4 ق/هك ⚡								
		أزوسول® 5 إلى 6 ق/هك أو أزوبلوس® 5 ق/هك أو أزوفارت® 9 ق/هك ⚡						
		ستارتصول® 25 كغ/هك ⚡		ماجيصول® 25 كغ/هك ⚡			فاتصول® أو فينالصول® أو كالينيتصول® أو بوتاصول® 25 كغ/هك ⚡	
		هيوميستار® 60 ل/هك ⚡						
		ترادكوب® AZ II 3 كغ/هك أو أتون® AZ 3 ل/هك ⚡						
		أولترافيرو® أو سيكستران® أو ترادفيرو® K6 أو جرينفير® إنيري جي 3 كغ/هك ⚡						
		ترادكوب® Mn 5 كغ/هك ⚡						
		ترادكوب® Zn 3 كغ/هك ⚡						
		روتر® AA فيج 3 ل/هك ⚡		ميكروفارت® أو دلفان بلوس® 3 ل/هك أو فيلقرين® 1 ل/هك ⚡				
		فيتال® K 10 ل/هك ⚡						
		طرافس® K 3 ل/هك ⚡						
براول® أكوا 2,5 ل/هك ⚡		كاسبر® 0.3 كغ/هك						
		دالتارين® 0.5 ل/هك أو أبهولد® 0.35 ل/هك أو بيوسبي® 0.2 ل/هك أو بروكلايم® 250 غ/هك ⚡						
التعشيب الكيميائي		المعالجة بالمبيدات الفلاحية						
حشرات الأوراق : حرشفيات الأجنحة								



- لتحميض محلول المعالجة الفلاحية يجب استعمال لور® 7 بجرعة 300 ملل/ 1000 ل من الماء.
- استعمال المنشطات الحيوية (دلفان® بلوس أو ميكروفارت®) في فترة الإجهاد اللاحيوي (جليد و جفاف) و الإجهاد الحيوي (الأضرار التي تسببها الأمراض و الحشرات الضارة).
- ملاحظة هامة : أنواع حرشفيات الأجنحة : ورقلة : الفراشات الليلية للذرة، الفراشات الليلية للطماطم . أدرار، المنيعه و تيميمون : الفراشات الليلية للطماطم،



استعمال جذري



استعمال ورقي