


**BIO -
NUTRIMENTS
ET ACIDES
AMINES**



**EXCELLENT DÉVELOPPEMENT
RACINAIRE ET MEILLEUR
RENDEMENT DES CULTURES**

Ruter AA[®]



DESCRIPTION

- Ruter AA est un bio stimulant racinaire. Il contient les 3 éléments nutritifs majeurs (NPK), des oligo-éléments, de la matière organique et des acides aminés. Cette formulation complète apporte à la plante tous les éléments dont elle a besoin aux moments cruciaux que sont la plantation, le semis ou le repiquage.
- Ruter AA permet un bon développement des racines au démarrage pendant le semis, à la plantation et au repiquage.
- Ruter AA stimule la croissance de la plante en début de cycle.
- Ruter AA stimule la plante en situation de stress provoqué par:
 - De mauvaises conditions climatiques : chaleurs excessives à la plantation, froid en période début de grossissement... etc.
 - Changement de milieu de culture à la transplantation.
 - Les blessures.
 - Les troubles nutritionnels.

COMPOSITION

- Acides aminés libres : 8,4% p/v (7% p/p),
- Azote total (N) : 6,6% p/v (5,5% p/p),
- Phosphore pentoxide (P₂O₅) : 6% p/v (5% p/p),
- Oxyde de Potassium (K₂O) : 4,2% p/v (3,5% p/p)
- Matière organique : 18% p/v (15% p/p),
- Fer chélaté à l'EDDHA : 0,04% p/v (0,036% p/p),
- Zinc chélaté à l'EDTA : 0,08% p/v (0,07% p/p),
- Manganese chélaté à l'EDTA : 0,06% p/v (0,05% p/p),
- Molybdène : 0,12% p/v (0,1% p/p),

UTILISATION ET DOSES D'EMPLOI

CULTURES	DOSES (L/ha)
Arbres fruitiers et agrumes	2 à 4 applications à la dose de 6 à 10 L/ha par application après plantation, durant les premiers stades de croissance et éventuellement durant tout le cycle.
Vigne et olivier	2 à 4 applications au moment de la reprise de l'activité des racines et durant tout le cycle de la plante à la dose de 4 à 8 L/ha par application.
Cultures maraîchères	3 à 4 applications à la dose 6 à 8 L/ha par application, après repiquage, durant les premiers stades de l'installation de la culture, et éventuellement durant tout le cycle.

Incorporation dans les substrats : Pépinières : à diluer avec une concentration de 0.3 à 0.6% au moment de la préparation du substrat.

Il est recommandé d'appliquer Ruter AA durant les premiers stades, les périodes critiques : repiquage, croissance active, avant floraison, à la nouaison, au grossissement des fruits et durant les conditions de stress : fortes chaleur, gel, salinité, etc

COMPATIBILITE

- Ruter AA est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires sauf les huiles minérales, les produits à base de cuivre, soufre. Ne pas mélanger avec les produits à pH élevé.
- Effectuer un essai avant emploi.



4 Chemins 06000 Béjaia (Algérie)
Tel : 0 34 10 25 31 Fax : 0 34 10 22 30
e-mail : info@profert-dz.com
www.profert-dz.com



Alcalá, 498 - 2e - 28027 Madrid (Espagne)
Tel.: + 34 91 3273200 - Fax: + 34 91 3047
e-mail: global@tradecorp.sapec.pt

www.tradecorp.com.es