



GRENADIER


Programme d'amendements organiques, de nutrition, fertilisation foliaire et de traitements phytosanitaires

Objectif 600 q/ha



	BOURGEON D'HIVER	GONFLEMENT - POINTE ROUGE	SORTIE DES FEUILLES	ALLONGEMENT DES ENTRE-NOEUDS	APPARITION DES BOURGEONS FLORAUX	FLEUR OUVERTE	MISE À FRUIT	JEUNE FRUIT	CROISSANCE DES FRUITS	MATURATION DES FRUITS
FERTILISATION	☼ Organo® Citrus 10 q/ha			☼ NPK 16.8.24 : 6,5 q/ha			☼ N.P.K 15.5.35 : 2 q/ha			
TRAITEMENT PHYTOSANITAIRES	Adventices	☼ Basta® 3 L/ha					☼ Gallant® Super 1,5 L/ha			
	Aspergillus					☼ Naturam® 5 : 2,5 L/ha				
	Pucerons	☼ Naturam® 5 2,5 L/ha + ☼ Afaio Elite® 0,5 à 2 L/hl	☼ Wide® 30 g/hl			☼ Nori® Pro 0,15 L/hl				
	Acariens					☼ Vertimec® 0,5 L/ha		☼ Bymite® 0,4 L/ha		
	Zeuzère	Traitement d'hiver				☼ Uphold® 0,35 L/ha		☼ Deltharin® 0,5 L/ha		
	Pyrale des caroubes									
	Cératite									* Nutrel® 3 L/ha + Deltharin® 0,5 L/ha
	Nématodes	☼ Velum® Prime 0,625 L/ha								
NUTRITION	Acides humiques	☼ Humistar® 50 L/ha								
	Bioestimulants	☼ Phylgreen® 1 L/ha			☼ Delfan® plus 2 L/ha ou Vegenergy® 2 L/ha ou Microfert® 3 L/ha		☼ Delfan® plus 2 L/ha ou Vegenergy® 2 L/ha ou Microfert® 3 L/ha			
	Fer	☼ Ultraferro® ou Séquestrene® 15 kg/ha					☼ Ultraferro® ou Sequestrene® 15 kg/ha			
	Bore				☼ Phylgreen® alya 1,5 L/ha		☼ Tradebor® 1 L/ha			
	Calcium				☼ Phylgreen® electra 1,5 L/ha		☼ Boramin® Ca 3 L/ha		☼ Boramin® Ca 3 L/ha	☼ Boramin® Ca 3 L/ha
	Zinc				☼ Tradecitrus® 1 kg/ha		☼ Tradecitrus® 1 kg/ha			
	SDN et grossissement des fruits						☼ Trafos® K 3 L/ha 2 applications		☼ Fainal® K 3 L/ha 2 applications	
	Protection contre les brûlures solaires	☼ ECLIPSE® 25 à 50 kg/ha								

Concept Profert SPA 2025



- Fractionner la dose complète de l'**Humistar®** en 3 à 4 applications.
- **NB** : Il est conseillé d'éviter les traitements au stade floraison.
- * Appliquer l'association **Nutrel®** + **Deltharin®** pour piégeage massif (50 à 80 pièges/ha).

- Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez **Lower® 7** à la dose de 300 ml/ 1000L d'eau.
- En cas de stress (traitement phytosanitaire, température élevée, sécheresse, gel, etc.) utilisez **Delfan® Plus** ou **Microfert®** ou **Vegenergy®** à raison de 3 L/ha.
- **Boramin® Ca** en 2 applications à raison de 3 L/ha chacune.
- Pour l'usage en tant que fongicide et insectifuge, appliquer **ECLIPSE®** à la dose de 12,75 kg/ha.





نضج الثمار	نمو الثمار	ثمرة فتية	تكون الثمرة	تفتح الزهرة	ظهور البراعم الزهرية	استطالة ما بين العقد	خروج الأوراق	انتفاخ البرعم - قمة حمراء	البرعم الشتوي	التسميد
										أورفانو سيتروس 10 ق/هك
	كالتت سوبر® 1,5 ل/هك									الأعشاب الضارة
		ناتورام® 5 : 2,5 ل/هك								فطر أسبيرجيلوس
					وايد® 30 غ/هك					حشرات المن
		نوري پرو® 0,15 ل/هك								العناكب
		بايميت® 0,4 ل/هك	فرتيمك® 0,5 ل/هك							حفار ساق الرمان
										فراشة الخروب
		دالتارين® 0,5 ل/هك	أبهولد® 0,35 ل/هك							ذبابة الفاكهة
	نوترال® 3 ل/هك + دالتارين® 0,5 ل/هك									النيماتودا
										الأحماض الهيوميكية
										المنشطات الحيوية
										الحديد
										البور
										الكالسيوم
										الزنك
										محفزات المقاومة الطبيعية و تضخم الثمار
										الحماية من خطر الإصابة بالحروق الشمسية



• لتحضير محلول الأسمدة و محلول المعالجة بالمبيدات الفلاحية، استعملوا لور® 7 بجرعة 300 ملل/ 1000 ل من الماء.
 • في حالة الإجهاد (المعالجة بالمبيدات الفلاحية، درجة حرارة عالية، جفاف، جليد... إلخ) استعملوا دلفان® بلس أو ميكروفارت® أو فيجينيري® بجرعة 3 ل/هك.
 • بورامين® Ca مرتين بمعدل 3 ل/هك.
 • للاستعمال كمبيد للفطريات و طارد للحشرات، تطبيق إكلييس® بجرعة 12,75 كغ/هك.

• تقسيم الجرعة الكاملة لهيوميستار® من 3 إلى 4 استعمالات.
 • ملاحظة هامة : يُنصح تفادي المعالجة في مرحلة الإزهار.
 • مزج نوترال® + دالتارين® لاصطياد الحشرات بأعداد كبيرة (50 إلى 80 مصيدة/هك).

استعمال جذري

استعمال ورقي

