



Application racinaire

Application foliaire


- Fractionner la dose complète de l'**Humistar**® en 3 à 4 applications.
- NB: Il est conseillé d'éviter les traitements au stade floraison.
- * Appliquer l'association Nutrel® + Deltharin® pour piègeage massif (50 à 80 pièges/ha).
- Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez Lower® 7 à la dose de 300 ml/ 1000L d'eau.
- En cas de stress (traitement phytosanitaire, température élevée, sécheresse, gel, etc.) utilisez Delfan® Plus ou Microfert® ou Vegenergy® à raison de 3 L/ha.
- Boramin® Ca en 2 applications à raison de 3 L/ha chacune.

















• تقسيم الجرعة الكاملة لهيوميستار $^{\circ}$ من 3 إلى 4 استعمالات.

* مزج **نوترال** ® + **دالثارين**® للصطياد الحشرات بأعداد كبيرة (50 إلى 80 مصيدة/هك).

• ملاحظة هامة: يُنصح تفادي المعالجة في مرحلة الإزهار.



[•] في حالة الإجهاد (المعالجة بالمبيدات الفلاحية، درجة حرارة عالية، جفاف، جليد...إلخ) استعملوا **دلفان® بلوس** أو **ميكروفارت®** أو **فيجينيرجي®** بجرعة 3 ل/هك.

Profert

[•] بورامین ®Ca مرتین بمعدل 3 ل/هك.