




MELON EN GOUTTE À GOUTTE

Programme de fertilisation, de nutrition et des traitements phytosanitaires

Objectif de rendement: 80 T/ha



		Repiquage - Nouaison					Fin nouaison - Fin grossissement								
															
Semences	Semences	Avira® ou Anasia® 6 000 plants /ha													
Fertilisation	NPK	☼ Organo Curbi® 4 q/ha			☼ Tomasol® 1: 5 q/ha				☼ Tomasol® 3 : 5 q/ha						
	Calcium				☼ Calnisol® 2 q/ha										
Nutrition	Acide humique	☼ Humistar® 50 L/ha - Fractionner la dose avant chaque fertilisation													
	Biostimulant racinaire	☼ Ruter® AA Veg 10 L/ha													
	Acides aminés			☼ Delfan® Plus ou Microfert® ou Vegenergy® 3 L/ha -2 applications en pré-floraison et post-floraison											
	Extrait d'algues			☼ Phylgreen® 1,5 à 2 L/ha											
	Manganèse				☼ Tradecorp® Mn 6 kg /ha fractionner la dose en 3 à 4 applications										
	Bore			☼ Phylgreen® Alya 2 à 3 L/ha avant la floraison ou ☼ Tradebor® 6 L/ha - fractionner la dose en 2 à 3 applications											
	Fer			☼ Ultraferro® ou Sequestrene® 4 kg/ha ou Tradeferro K6 2 kg/ha - Fractionner la dose en 2 à 3 applications											
	Stimulation des défences naturelles				☼ Trafos® K 3 L/ha										
	Potassium foliaire					☼ Fainal® K 4 L/ha - 2 applications									
	Calcium			☼ Phylgreen® Electra 2 à 3 L/ha -Avant chaque nouaison ou ☼ Boramin Ca® 8 à 10 L/ha - fractionner la dose en 2 à 3 applications											
	Correcteur de carences multiples				☼ Tradecorp® AZ II 3 kg/ha - Fractionner la dose en 2 à 3 application										
Adventices	Graminées et Dicotylédones	☼ * Sencor® 0,75 à 1 L/ha ou Prowl Aqua® 3 L/ha													
Maladies	Maladies du sol	☼ Uniform® 1 L/ha ou Aliette Flash® 2,5 kg/ha ou Byspore® 3 L/ha													
	Bactéries														
	Mildiou			☼ Naturam® 5 : 2,5 L/ha	☼ Cyzoki® 0,5 L/ha	☼ Byspore® 3 L/ha ou Carial® 4 kg/ha	☼ Infinito® 1,5 L/ha	☼ Naturam® 5 : 2,5 L/ha ou Kocide® 2000 : 1,5 kg/ha	☼ Byspore® 3 L/ha	☼ Ceres® 0,5 L/ha	☼ Cyzoki® 0,5 L/ha				
	Alternaria										☼ Score® 0,5 L/ha	☼ Stroby® 0,2 kg/ha	☼ Score® 0,5 L/ha		
	Oïdium			☼ Thiovit® Jet 3 kg/ha			☼ Stroby® 0,2 kg/ha		☼ Score® 0,5 L/ha	☼ Stroby® 0,2 kg/ha				☼ Score® 0,5 L/ha	
	Anthraxnose														
	Ravageurs	Insectes du sol	☼ Force 15 kg/ha												
Acariens						☼ Pilaravia® 0,5 à 1 L/ha		☼ Nori® Pro 0,1 L/hl	☼ Movento® 0,5 L/ha	☼ Vertimec® 0,5 L/ha		☼ Bymite® 0,4 L/ha		☼ Magus® 1 L/ha	
Pucerons					☼ Wide® 20 à 30 g/hl					☼ Deltharin 0,5 L/ha		☼ Wide® 20 à 30 g/hl			
Mouches blanches															
Thrips						☼ Biospi® 0,3 L/ha	☼ Runner® 0,4 L/ha			☼ Tracer® 60 ml/hl					
Noctuelles défoliatrice											☼ Uphold® 0,35 L/ha				
Nématodes	Nématodes	☼ Velum® Prime 1,25 L/ha													

-  Application au sol
-  Application foliaire

Velum® Prime : En plein dose 1,25 L/ha, 1 à 3 jours après repiquage ou fractionner 0,625 L/ha, 1 à 3 jours après repiquage et 0,625 L/ha, 15 à 30 jours après la première application.

* **Sencor®** application au sol, 0,75 L/ha pour les sols léger, 1 L/ha pour les sols lourds.

Nori® Pro: se référer à la fiche technique concernant les recommandations d'application.

Pour une meilleur efficacité des produits, utiliser l'adjuvant **Codacide®** à la dose de 1 à 2,5 L/ha.

Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez **Lower®** 7 à la dose de 300 ml/ 1000L d'eau.

Pour corriger la salinité du sol, utilisez **Saltrad®Ca** 20 L/ha, fractionner en 3 applications.





التشتيل - تشكل العقد										نهاية تشكل العقد - نهاية التضخم									
  										    									
أفيرا® أو أنازيا® 6000 شتلة/هك																			
أورفانو كوربي® 4 ق/هك										طوماصول® 1 - 5 ق/هك									
										كالنيسول® 2 ق/هك									
										هيوميستار® 50 ل/هك - تقسيم الجرعة قبل كل عملية تسميد									
روتر® AA فيج 10 ل/هك																			
										دلفان® بلوس أو ميكروفارت® أو فيجينبرجي® 3 ل/هك -إستعمالين قبل و بعد الإزهار									
										فيلقرين® 1,5 إلى 2 ل/هك									
										ترادكورب® Mn 6 كغ/هك - تقسيم الجرعة 3 إلى 4 إستعمالات									
										فيلقرين® أليا 2 إلى 3 ل/هك قبل الإزهار أو ترادبور® 6 ل/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 إستعمالات ^(١)									
										أولترافيرو® أو سيكيستران® 4 كغ/هك أو ترادفيرو® K6 2 كغ/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
										طرافس® K 3 ل/هك									
										فينال® K 4 ل/هك - تطبيق الجرعة مرتين									
										فيلقرين® إلكترا 2 إلى 3 ل/هك قبل تشكل العقد أو بورامين® Ca 8 إلى 10 ل/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
										ترادكورب® AZII 3 كغ/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
										مصحح مختلف النقااص									
الاعشاب الضارة الأحادية الفلقة و الثنائية الفلقة										*سانكور® 0,75 إلى 1 ل/هك أو براول® أكوا 3 ل/هك									
أمراض التربة										*يونيفورم® 1 ل/هك أو أليات® فلاش 2,5 كغ/هك أو بايسبور® 3 ل/هك									
البكتيريا																			
الميلديو (البياض الزغبي)										ناتورام® 5 2,5 ل/هك									
الآلترناريا										سيزوكي® 0,5 ل/هك									
الأويديوم (البياض الحقيقي)										ثيوفيت® جيت 3 كغ/هك									
الأنثراكنوز																			
حشرات التربة										فورس® 15 كغ/هك									
العناكب (القراديات أو الرتيلة)																			
المن										وايد® 20 إلى 30 غ/هل									
الذباب الأبيض																			
التربيس																			
الفراشات الليلية الأكلة للأوراق																			
الديدان الخيطية (النيماتودا)										فيلوم® برايم 1,25 ل/هك									



لتحقيق فعالية قصوى للمنتجات، استعملوا المادة المساعدة **كوداسيد®** بجرعة 1 إلى 2,5 ل/هك. لتحريض محلول التسميد و خليط المعالجة، استعملوا **لور®7** بجرعة 300 مل/1000 ل من الماء. لتصحيح ملوحة التربة، استعملوا **سالتراد® Ca** 20 ل/هك، تقسيم الجرعة إلى ثلاثة استعمالات.

فيلوم® برايم: بجرعة كاملة 1,25 ل/هك، بعد 1 إلى 3 أيام من نقل الشتلة أو تقسيم الجرعة إلى 0,625 ل/هك، بعد 1 إلى 3 أيام من نقل الشتلة و 0,625 ل/هك، بعد 15 إلى 30 يومًا من التطبيق الأول. ***سانكور®**، تطبيق على التربة، 0,75 ل/هك للتربة الخفيفة، 1 ل/هك للتربة الثقيلة. **نورير® پرو**: يُرجى الاطلاع على النشرة التقنية للحصول على تفاصيل التوصيات الخاصة بالتطبيق.

استعمال في التربة
استعمال ورقي

