



PASTÈQUE EN GOUTTE À GOUTTE

Programme de fertilisation, de nutrition et des traitements phytosanitaires

Objectif de rendement: 80 T/ha



Semences	Semences	Arashan® ou Liverpool® 5 000 à 7 000 plants /ha													
Fertilisation	NPK	🌿 Organo Curbi® 4 q/ha			🌿 Tomasol® 1: 5 q/ha						🌿 Tomasol® 3 : 5 q/ha				
	Calcium				🌿 Calnisol® 2 q/ha										
Nutrition	Acide humique	🌿 Humistar® 50 L/ha - Fractionner la dose avant chaque fertilisation													
	Biostimulant racinaire	🌿 Ruter® AA Veg 10 L/ha													
	Acides aminés		🌿 Delfan® Plus ou Microfert® ou Vegenergy® 3 L/ha -2 applications en pré-floraison et post-floraison												
	Extrait d'algues		🌿 Phylgreen® 1,5 à 2 L/ha												
	Manganèse				🌿 Tradecorp® Mn 6 kg /ha fractionner la dose en 3 à 4 applications										
	Bore		🌿 Phylgreen® Alya 2 à 3 L/ha avant la floraison ou 🌿 Tradebor® 6 L/ha - fractionner la dose en 2 à 3 applications ⁽¹⁾												
	Fer		🌿 Ultraferro® ou Sequestrene® 4 kg/ha ou Tradeferro K6 2 kg/ha - Fractionner la dose en 2 à 3 applications												
	Stimulation des défences naturelles				🌿 Trafos® K 3 L/ha										
	Potassium foliaire						🌿 Fainal® K 4 L/ha - 2 applications								
	Calcium		🌿 Phylgreen® Electra 2 à 3 L/ha -Avant chaque nouaison ou 🌿 Boramin Ca® 8 à 10 L/ha - fractionner la dose en 2 à 3 applications												
	Correcteur de carences multiples				🌿 Tradecorp® AZ II 3 kg/ha - Fractionner la dose en 2 à 3 application										
Adventices	Graminées et Dicotylédones	🌿 * Sencor® 0,75 à 1 L/ha ou Prowl Aqua® 3 L/ha													
Maladies	Maladies du sol	🌿 Uniform® 1 L/ha ou Aliette Flash® 2,5 kg/ha ou Byspore® 3 L/ha													
	Bactéries		🌿 Naturam® 5 : 2,5 L/ha				🌿 Infinito® 1,5 L/ha	🌿 Naturam® 5 : 2,5 L/ha ou Kocide® 2000 : 1,5 kg/ha	🌿 Byspore® 3 L/ha	🌿 Ceres® 0,5 L/ha	🌿 Cyzoki® 0,5 L/ha				
	Mildiou			🌿 Cyzoki® 0,5 L/ha	🌿 Byspore® 3 L/ha ou Carial® 4 kg/ha						🌿 Score® 0,5 L/ha	🌿 Ceres® 0,5 L/ha	🌿 Cyzoki® 0,5 L/ha		
	Alternaria														
	Oïdium		🌿 Thiovit® Jet 3 kg/ha			🌿 Stroby® 0,2 kg/ha			🌿 Score® 0,5 L/ha	🌿 Stroby® 0,2 kg/ha				🌿 Score® 0,5 L/ha	
	Anthraxnose														
	Ravageurs	Insectes du sol	🌿 Force 15 kg/ha												
Acariens				🌿 Wide® 20 à 30 g/hl	🌿 Pilaravia® 0,5 à 1 L/ha	🌿 Nori® Pro 0,1 L/hl	🌿 Movento® 0,5 L/ha	🌿 Vertimec® 0,5 L/ha	🌿 Bymite® 0,4 L/ha	🌿 Magus® 1 L/ha					
Pucerons															
Mouches blanches															
Thrips															
Noctuelles défoliatrice				🌿 Uphold® 0,35 L/ha	🌿 Biospi® 0,3 L/ha	🌿 Runner® 0,4 L/ha	🌿 Deltharin 0,5 L/ ha	🌿 Wide® 20 à 30 g/hl	🌿 Tracer® 60 ml/hl						
Nématodes	Nématodes	🌿 Velum® Prime 1,25 L/ha													

-
-

Velum® Prime : En plein dose 1,25 L/ha, 1 à 3 jours après repiquage ou fractionner 0,625 L/ha, 1 à 3 jours après repiquage et 0,625 L/ha, 15 à 30 jours après la première application.

* **Sencor®** application au sol, 0,75 L/ha pour les sols leger, 1 L/ha pour les sols lourds.

Nori® Pro: se référer à la fiche technique concernant les recommandations d'application.


Pour une meilleur efficacité des produits, utiliser l'adjuvant **Codacide®** à la dose de 1 à 2,5 L/h

Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez **Lower®** 7 à la dose de 300 ml/ 1000L d'eau.

Pour corriger la salinité du sol, utilisez **Saltrad®Ca** 20 L/ha, fractionner en 3 applications.





التشتيل - تشكل العقد										نهاية تشكل العقد - نهاية التضخم									
										    									
البذور										أرشان® أو ليفربول® 5 000 إلى 7 000 شتلة/هك									
التسميد										NPK أورثانو كوربي® 4 ق/هك كالكسيوم كالكسيوم									
حمض الهيوميك										هيوميستار® 50 ل/هك مع تقسيم الجرعة قبل كل عملية تسميد									
منشط حيوي جذري										روت® AA فيج 10 ل/هك									
أحماض أمينية										دلفان® بلوس أو ميكروفارت® أو فيجينيرجي® 3 ل/هك -إستعمالين قبل و بعد الإزهار									
مستخلص الطحالب										فيلفرين® 1,5 إلى 2 ل/هك									
المنغنيز										ترادكوب® Mn 6 كلغ/هك - تقسيم الجرعة 3 إلى 4 إستعمالات									
البور										فيلفرين® أليا 2 إلى 3 ل/هك قبل الإزهار أو ترادبور® 6 ل/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 إستعمالات ^(١)									
الحديد										أولترافيرو® أو سيكيستران® 4 كلغ/هك أو ترادفيرو® K6 2 كلغ/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
تحفيز المقاومة الطبيعية للنبته										طرافس® K 3 ل/هك									
البوتاسيوم الورقي										فينال® K 4 ل/هك - تطبيق الجرعة مرتين									
الكالسيوم										فيلفرين® إلكترا 2 إلى 3 ل/هك قبل تشكل العقد أو بورامين® Ca 8 إلى 10 ل/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
مصحح مختلف النقاخص										ترادكوب® AZII 3 كلغ/هك - تقسيم الجرعة 2 إلى 3 استعمالات									
الأعشاب الضارة										سانكور® 0,75 إلى 1 ل/هك أو براول® أكوا 3 ل/هك									
أمراض التربة										يونيفورم® 1 ل/هك أو أليات® فلاش 2,5 كغ/هك أو بايسبور® 3 ل/هك									
البكتيريا										ناتورام® 5 2,5 ل/هك									
الميلديو (البياض الزغبي)										سيزوكي® 0,5 ل/هك سيزوكي® 0,5 ل/هك									
الألترناريا										ناتورام® 5 2,5 ل/هك									
الأوديوم (البياض الدقيقي)										ثيوفيت® جيت 3 كغ/هك									
الأنثراكنوز										ثيوفيت® جيت 3 كغ/هك									
حشرات التربة										فورس® 15 كغ/هك									
العناكب (القراديات أو الرتيلة)										نوري® پرو 0,1 ل/هك									
المن										بيلارافيا® 0,5 إلى 1 ل/هك									
الذباب الأبيض										وايد® 20 إلى 30 غ/هك									
التريپس										وايد® 20 إلى 30 غ/هك									
الفراشات الليلية الأكلة للأوراق										أبهولد® 0,35 ل/هك									
النيماتودا										فيلوم® برايم 1,25 ل/هك									